

Fortimel[®] DiaCare

Technische Fiche



1. BENAMING + SMAKEN

Fortimel DiaCare is beschikbaar in 3 smaken: aardbei, chocolade en vanille.

Voor bestelcode, zie prijzenlijst Nutricia Advanced Medical Nutrition.

2. VERPAKKING

Fortimel DiaCare: cluster met 4 flesjes van 200 ml, 1 tray met 6 clusters.

3. CATEGORIE

Voeding voor medisch gebruik. Specifieke eisen voor de samenstelling en de etikettering van voeding voor medisch gebruik zijn vastgelegd in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/128 en sommige bepalingen van punt 4.2 van de bijlage van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding.

Fortimel DiaCare is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding bij patiënten met diabetes mellitus of hyperglycemie. Te gebruiken onder medisch toezicht.

Fortimel DiaCare is een drinkvoeding speciaal afgestemd op de voedingsbehoefte van diabetespatiënten.

Fortimel DiaCare is een volledige, kant-en-klare drinkvoeding, in een flesje van 200ml. Het bevat specifieke koolhydraten, eiwitten en vetten, evenals een unieke vezelmix, die ervoor zorgen dat de belasting op de suikerspiegel minimaal is.

4. PRODUCTIEPLAATS

NUTRICIA N.V.

Zoetermeer

NEDERLAND

5. SAMENSTELLING

5.1. Allergenen

Fortimel DiaCare is glutenvrij. Met isomaltulose en zoetstoffen. Bevat melk en soja.

5.2. Ingrediënten

| Drinkvoeding | Ingrediënten | Allergenen | Datum |
|---------------------------------|---|------------------|--------|
| Fortimel DiaCare vanillesmaak | Koemelkeiwitten, water, dextrine-maltose, isomaltulose*, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (van koemelk suiker), aroma, emulgator (sojalecithine), zuurteregelaar (citroenzuur), kaliumcitraat, cholinechloride, magnesiumhydroxide, natrium L-ascorbaat, kaliumhydroxide, natriumcitraat, kleurstof (curcumine), ijzerlactaat, DL- α -tocoferylacetaat, nicotinamide, retinylacetaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, zoetstof (acesulfaam-K), natriumseleniet, zinksulfaat, chroomchloride, calcium D-pantothenaat, D-biotine, cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, thiaminehydrochloride, natriummolybdaat, zoetstof (natriumsacharine), natriumfluoride, kaliumjodide, riboflavine, fyllochinon. *Isomaltulose is een bron van glucose en fructose. | Bevat melk, soja | 072021 |
| Fortimel DiaCare aardbeismaak | Koemelkeiwitten, water, dextrine-maltose, isomaltulose*, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (van koemelk suiker), aroma, emulgator (sojalecithine), zuurteregelaar (citroenzuur), kleurstof (karmijnzuur), kaliumcitraat, cholinechloride, magnesiumhydroxide, natrium L-ascorbaat, kaliumhydroxide, natriumcitraat, ijzerlactaat, DL- α -tocoferylacetaat, nicotinamide, zoetstof (acesulfaam-K), retinylacetaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, zinksulfaat, chroomchloride, calcium D-pantothenaat, D-biotine, zoetstof (natriumsacharine), cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, thiaminehydrochloride, natriummolybdaat, natriumfluoride, kaliumjodide, riboflavine, fyllochinon. *Isomaltulose is een bron van glucose en fructose. | Bevat melk, soja | 072021 |
| Fortimel DiaCare chocoaltesmaak | Koemelkeiwitten, water, dextrine-maltose, isomaltulose*, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), galacto-oligosachariden (van koemelk suiker), cacao, aroma, emulgator (sojalecithine), zuurteregelaar (citroenzuur), cholinechloride, magnesiumhydroxide, natrium L-ascorbaat, natriumcitraat, kaliumhydroxide, stabilisator (carrageen), zoetstof (acesulfaam-K), kaliumchloride, ijzerlactaat, DL- α -tocoferylacetaat, nicotinamide, retinylacetaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, zinksulfaat, chroomchloride, calcium D-pantothenaat, D-biotine, cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, zoetstof (sucralose), thiaminehydrochloride, zoetstof (natriumsacharine), natriumfluoride, natriummolybdaat, kaliumjodide, riboflavine, fyllochinon. *Isomaltulose is een bron van glucose en fructose. | Bevat melk, soja | 072021 |

5.3. Voedingswaardetabel

| Fortimel DiaCare | | | samenstelling | | |
|--------------------------------|---------|---------|----------------|------|--------------------|
| Gemiddeld gehalte per 100 ml*: | | | | | |
| ENERGIE | 635/151 | kJ/kcal | SPOORELEMENTEN | | |
| VETTEN (32 En%) | 5,3 | g | Fe | 2,1 | mg |
| verzadigd vet | 0,6 | g | Zn | 1,6 | mg |
| enkelv. onverz. vet | 3,2 | g | Cu | 0,34 | mg |
| meerv. onverz. vet | 1,5 | g | Mn | 0,63 | mg |
| - linolzuur | 1,21 | g | F | 0,19 | mg |
| - α -linoleenzuur | 0,24 | g | Mo | 19 | μ g |
| AA | - | mg | Se | 11 | μ g |
| DHA | - | mg | Cr | 13 | μ g |
| EPA | - | mg | I | 25 | μ g |
| KOOLHYDRATEN (41 En%) | 15,6 | g | VITAMINEN | | |
| glucose | 0,4 | g | A | 188 | μ g |
| fructose | - | g | carotenoiden | - | mg |
| lactose | 3,4 | g | D | 1,3 | μ g |
| maltose | 0,3 | g | E | 2,3 | mg (α -TE) |
| sacharose | - | g | K | 10 | μ g |
| polysachariden | 5,5 | g | thiamine | 0,28 | mg |
| isomaltulose | 5,6 | g | riboflavine | 0,31 | mg |
| overige | 0,4 | | niacine | 1 | mg |
| VEZELS (1 En%) | 0,7** | g | niacine | 3,4 | mg NE |
| EIWITTEN (26 En%) | 9,8 | g | pantotheenzuur | 1 | mg |
| caseine | 7,8 | g | B6 | 0,33 | mg |
| wei-eiwit | 2 | g | foliumzuur | 50 | μ g |
| ZOUT | 0,12 | g | B12 | 0,7 | μ g |
| VOCHT | 76 | ml | biotine | 7,5 | μ g |
| MINERALEN | | | C | 19 | mg |
| Na | 50 | mg | OVERIGE | | |
| K | 200 | mg | carnitine | - | mg |
| Cl | 83 | mg | choline | 69 | mg |
| Ca | 280 | mg | taurine | - | mg |
| P | 195 | mg | OSMOLARITEIT | 530 | mOsmol/l |
| Mg | 40 | mg | | | |
| * vanillesmaak | | | | | |
| ** chocoladesmaak bevat 1 g | | | | | |
| 072021 | | | | | |

Tabel 1 : Voedingswaarden van Fortimel DiaCare (Smaken: aardbei, chocolade en vanille).

6. GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbevolen koel en droog te bewaren. Goed schudden voor gebruik. Klaar voor gebruik en smaakt gekoeld het lekkerst. Na openen, flesje afsluiten en in de koelkast bewaren gedurende maximaal 24 uur.

De smaken chocolade en vanille mogen worden opgewarmd zolang de warmte een temperatuur van 60 °C niet overschrijdt teneinde de vitamines te behouden.

7. AANVULLEND ADVIES

7.1. Belangrijk advies

Uitsluitend voor enteraal gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Met voorzichtigheid gebruiken bij kinderen tussen 3 en 6 jaar.

8. BEWAARINSTRUCTIES

8.1. Voor opening

De flesjes moeten bewaard worden op een donkere plaats met een temperatuur tussen 4 en 25 °C.

8.2. Na opening

Een gesloten flesje kan in de koelkast bewaard worden (temperatuur < 4 °C) gedurende 24 uur.

9. LEVENSDUUR

Fortimel DiaCare heeft een houdbaarheidsdatum van 12 maanden vanaf de datum van productie.

10. ANNEXES



NL Voeding voor medisch gebruik

Met isomaltose en zouten van calcium, magnesium en kalium. Het isomaltose wordt vervaardigd uit zetmeel van aardappelen. Het isomaltose wordt vervaardigd uit zetmeel van aardappelen.

Belangrijke mededeling

Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsofstand. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Niet geschikt bij het gebruik van bijkanten tussen 3 en 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met een verhoogd risico op patiënten met galactosemie of fructosemie. Bij het introduceren van Fortimel DiaCare, is het raadzaam om te starten met een half flesje en de bloedsuikerspiegel te controleren. De behandeling kan mogelijk moeten worden aangepast. Plekking met worden gehouden met het getalbe aan K en P in het dagelijks dieet van patiënten met nierfalen.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden voor gebruik. Klaar voor gebruik en smaak gekoeld/bekleerd. Na openen, flesschutten in de koelkast bewaaren gedurende max. 24 uur. Verpakt onder beschermende atmosfeer.

Dozering

Aanvullend op de voeding, 1-2 flesjes per dag.

Ingrediënten

Koemelkeiwit, plantaardige olie (kocozadole, isomaltose*), galactooligosacchariden (van koemelk suiker), aroma (vanille), emulgator (sojapheytine), zuurte gelaar (citroenzuur), kaliumditraat, cholinechloride, magnesiumdioxide, natrium-L-ascorbate, kaliumhydroxide, natriumditraat, kleurstof (curcumine), jerditraat, DL-α-tocopherolacetate, nicotinamide, tetrahydrofuran, kopergluconaat, mangaansulfate zoutstof (aesculfam-K), natriumselefaat, zinksulfaat, dicalciumphosphate, calcium D-pantothenaat, D-biotine, cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, pteroylmogulaminezuur, thiaminehydrochloride, natriumthiofodaat, zoutstof (natriumsaccharine), natriumthiofodaat, kaliumphosphate, riboflavine, thioctine, *Isomaltose is een bron van glucose en fructose.



FR Després le alimentaire desintée a des fins médicales spéciales

Pour les besoins nutritionnels de s patients dénutris avec diabète ou hyperglycémie, Fortimel DiaCare est un complément nutritionnel oral hyperprotidique, hyperénergétique, avec fibres. Sans gluten.

Avis important

L'usage est strictement exclusif. A utiliser sous contrôle médical. Ne convient pas comme seule source d'alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. A utiliser avec précaution chez les enfants âgés de 3 à 6 ans. Ne convient pas aux patients ne assitant un régime sans fibres set aux patients atteints de galactosemie ou de fructosemie. Dans les premiers jours d'utilisation de Fortimel DiaCare, il est recommandé de commencer par une demi-bouteille et de surveiller la glycémie. Il sera peut-être nécessaire d'adapter le traitement. Les quantités de potassium et phosphore doivent être prises en compte dans la ration journalière des patients souffrant d'insuffisance rénale.

Mode d'emploi

A conserver de préférence dans un endroit frais set sec. Bien agiter avant utilisation. Prier à remplir. A consommer de préférence frais. Après ouverture, la bouteille reformée set conservée au réfrigérateur (max. 24h). Conditionnée sous atmosphère protectrice.

Posologie

1 à 2 bouteilles par jour en complément de l'alimentation.

Ingédients

Protéines de lait de vache, eau, dextrose-maltose, isomaltose*, huiles végétales (colza, bunssool), galactooligosaccharides (du sucre du lait de vache), arôme, emulsifiant (le citriline de soja), correcteur d'acidité (acide citrique), citrate de potassium, chlorure de choline, hydroxyde de magnésium, L-ascorbate de sodium, hydroxyde de potassium, citrate de sodium, colorant (curcumine), lactate ferreux, acétate de DL-α-tocopherol, nicotinamide, acétate de rétinol, gluconate de cuivre, sulfate de manganesé, éduloorant (aesculfame-K), selenite de sodium, sulfate de zinc, chlorure de drome, D-pantothénate de calcium, D-biotine, cholecalciferol, chlorhydrate de pyridoxine, acide pteroylmogulamineque, éduloorant (saccharinate de sodium), fluorure de sodium, iodure de potassium, riboflavine, pteroylmogulamine. *Isomaltose est une source de glucose et de fructose.

4 X 200 ml e = 800 ml

CZ Potravinna pro zlástní lékárské účely

S cukry a sladídky. Prořizenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí u pacientů s diabetem mellitus nebo hyperglykémií. Fortimel DiaCare je vysokoenergetická a kula výživná s vysokým obsahem bílkovin a vlákninou. Bez lepku.

Důležitá upozornění

Pouze pro lékařský použití. Není určeno pro domácí podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nemohou být jedinými zdroji výživy. Nemohou být použity do 3 let věku. Při podávání dětem ve věku od 3 do 6 let je nutno dávat zvýšené opatření. Nemohou být pro pacienty vyzádlující dietu bez vlákniny a pacienty s galactosemií nebo fructosemií. Při zavádění přípravku Fortimel DiaCare se doporučuje nejprve začít s podáváním malých dávek a postupně zvyšovat množství. U pacientů s ledvinovým selháním musí být monitorován celkový příjem dusíku a fosforu ve stravě.

Návod k použití

Skladujte na suchém a chladném místě. Před použitím dobře protřepejte. Určeno k přímému použití, nejlépe dříve a v chladnějším prostředí. Po otevření uchovávejte v uzavřené lahvičce v chladničce max. po dobu 24 hodin. Během v ochranné atmosféře.

Dávování

1-2 lahvičky denně k doplnění běžné stravy.

Složení

Bílkoviny z kvasného mléka, voda, maltodextrin, izomaltóza*, rostlinné oleje (řepkový, slunečnicový), galactooligosaccharidy z kvasného mléka (cukru), aroma (vanilká), emulgátor (sojový lečidlo), regulátor kyselosti (kyselina citronová), citronan draselný, cholin chlorid, hydroxid hořečnatý, laktobacil sodný, hydroxid draselný, citronan sodný, barvivo (kurkumín), měchán železnatý, DL-α-tocopherol-acetát, nicotinamid, retinyl-acetát, glukonan měďnatý, síran manganový, sledřidlo (aesculfam K), seleničnan sodný, síran zinečnatý, sledřidlo (aesculfam K), seleničnan sodný, síran zinečnatý, chlorid chromitý, D-pantotherrat vepenný, D-biotin, didekalciferol, pyridoxin hydrochlorid, kyselina pteroylmogulaminová, thiamin hydrochlorid, mořidlo denan sodný, sledřidlo (saccharin sodný), žlutid sodný, jodid draselný, riboflavín, thioctinon, *izomaltóza je zdrojem glukózy a fruktózy.

Ten minise houddaar dat ze bovenzijde verpakking

Minimuma trvanlivost do: viz horní strana obalu

Minimuma trvanlivost do: viz horní strana obalu

potřeba horní stranu obalu





4 X 200 ml e = 800 ml

NUTRICIA
Fortimel®
DiaCare

NUTRICIA
Fortimel®
DiaCare

4 X 200 ml e = 800 ml

Genéridid ghalte per 100 ml/Analyse moyenne pour 100 ml :/
Průměrný obsah ve 100 ml/Výživové údaje na 100 ml

| | | | |
|---|--------------------|--|------------------|
| Energie/ Energie/Energie | 635 kJ 151 kcal | Vit. E | 2.3 mg (α-TEFET) |
| Vetten/Lipides/Tuky | 5.3 g | Vit. K | 10 µg |
| waarvan/dont/z toho | | Thiamine/Thiamin/Tiamin | 0.28 mg |
| - Verzadigd/Saturés/Nasyčené mastné kyseliny/ | | Riboflavine/Riboflavin/Riboflavin | 0.31 mg |
| Nasyčené mastné kyseliny/ | 0.6 g | Niacine/Niacin/Niacin (3.4 mg NE/EN) | 1.0 mg |
| - Enkelvoudig onverzadigd/Monoinsaturés/ | | Pantothenzuur/Acide pantothénique/Kyselina | |
| Mononenasýčené mastné kyseliny/ | 3.2 g | panthénová/Kyselina pantoténová | 1.0 mg |
| Mononenasýčené mastné kyseliny/ | | Vit. B6 | 0.33 mg |
| - Meeroudig onverzadigd/Polysaturés/ | | Foliumzuur/Acide folique/Kyselina listová | 50 µg |
| Polynenasýčené mastné kyseliny/ | 1.5 g | Vit. B12 | 0.70 µg |
| Polynenasýčené mastné kyseliny | | Biotine/Biotin/Biotin | 7.5 µg |
| | | Vit. C | 19 mg |
| Koolhydraten/ Glucides/Sacharidy (41 En%) | 15.6 g | Mineeralelementen/ | |
| waarvan/dont/z toho | | Minéraux et oligo-éléments/ | |
| - Suikers/Sucres/Cukry | 9.7 g | Mineerální látky a stopové prvky/ | |
| -- isomaltulose/dont isomaltulose/ | | Mineerální látky a stopové prvky | |
| isomaltulóza/izomaltulóza | 5.6 g | Na | 50 mg |
| -- Lactose/Lactose/Laktóza | 3.4 g | K | 200 mg |
| - Polysaccharide n/Polysaccharides/Polysaccharidy | 5.5 g | Cl | 83 mg |
| | | Ca | 280 mg |
| Vezeles/Fibres/Vláknina (1 Er%) | 0.7 g | P | 195 mg |
| | | Mg | 40 mg |
| Eiwitten/Protéines/Bilkyiny/ | 9.8 g | Fe | 2.1 mg |
| Bilkyiny (25 En%) | | Zn | 1.6 mg |
| Zout/Sel/Sůl/Sof | 0.12 g | Overige/Autres/Jiné/Jiné | |
| Vitamine n/Vitamines/Vitami ny/Vitami ny | 188 µg | Choline/Cholin/Cholin | 69 mg |
| Vit. A | | Osmolariteit/Osmolarité/Osmolarita | 530 mOsmol/l |
| Vit. D | 1.3 µg | | |

Geproduceerd door: N.V. Nutricia,
Zoetermeer, Nederland.
N.V. Nutricia België,
Werkhuizenkaai 160 - 1000 Brussel, België.
Voor meer informatie: 0800 99486.
medical.nutrition@nutricia.be - www.nutricia.be
Fabriqué par : N.V. Nutricia, Zoetermeer, Pays-Bas.
Nutricia Belgique S.A.,
Quai des Usines, 160 - 1000 Bruxelles, Belgique.
Pour plus d'informations : 0800 99486.
medical.nutrition@nutricia.be - www.nutricia.be

NUTRICIA Nutrition Clinique,
1719 rue des deux gares, CS 50149,
92565 Rueil-Malmaison Cedex, France.
www.nutricia.fr
Výrobce: N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186,
2712 HM Zoetermeer, Nizozemsko
Kontakt pro ČR: Nutricia a.s., V parku 2294/2,
148 00 Praha 4 - Chodov, telefon: 800 110 001
Výrobce: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Holandsko
Kontakt pro SR: Nutricia a.s.,
V parku 2294/2,
148 00 Praha 4 - Chodov,
ČR. telefon: 800 444 006



SK Potravinna na osobitné lekárske účely.
Obsahuje cukry a sladidlá. Na deťny režim pri
podvýžive súvisiacej s ochorením u pacientov s diabetom
mellitus alebo hyperglykémiou. Fortimel DiaCare je
vysokoenergetická tekutá výživa s vysokým obsahom
biotínu. Obsahuje vlákninu. Bezgluténový.

Dôležité upozornenia: Len na enterálne použitie. Nie
je určené na parenterálne použitie. Používajte len pod
lekárskym dohľadom. Nevhodné ako jediný zdroj
výživy. Nevhodné pre deti do 3 rokov veku. Zvýšená
opatrnosť je potrebná u detí od 3 do 6 rokov. Nevhodné
pre pacientov, ktorí vyžadujú diétu bez vlákniny a pre
pacientov s galaktózémiou alebo fruktóze miou.
Priznávajúci prípravok Fortimel DiaCare sa odporúča
najskôr začať s polovicou fliašky a sledovať hladinu
glukózy v krvi, možno bude potrebné lečbu upraviť.
U pacientov so zlyhaním obličiek sa musí monitorovať
celkový príjem draslíka a fosforu v strave.

Návod na použitie: Skladujte na suchom a chladnom
mieste. Pred použitím dobre pretepte. Určené na priame
použitie, najlepšie chuti vychladené. Po otvorení fliašku
uzatvorte a uchovávajte v chladničke max. po dobu
24 hodín. Balenie v ochrannej atmosfére.

Dávkovanie: 1-2 fliašky denne na doplnenie bežnej
stravy

Zloženie: biotín, kvasenie mlieka, voda,
maltoextrin, izomaltulóza*, rastlinné oleje (repkový,
slnčnicový), galaktooligosacharidy (z kvasného
mliečného cukru), aroma (vanilka), emulgátor (sojový
lecitín), regulátor kyslosti (lyselina citrónová), citran
di sodný, hydroxid draselny, citran sodný, farbivo (karumín),
mliečan železný, DL-alfa-tokoferylacetát, nikotínamid,
retinylacetát, glukózan mednatý, síran mangánatý,
stadió (ace súlfám K), seleničitan sodný, síran zinnočnatý,
chloíd chionitý, D-panitolénatvápenatý, D-biotín,
cholekalciolol, pyridoxínhydrochlorid, lyselina
pteroylmonoglutámová, tiáminhydrochlorid, moxibidénan
sodný, stadió (sacharin sodný), fluorid sodný,
jodid draselny, riboflavin, fytoinonadion,
*izomaltulóza je zdrojom glukózy
a fruktózy.

